

Pic mineur

16/18 cm - *Picoides pubescens* / Downy Woodpecker

Ordre : Piciformes - Famille : Picidés

Statut : Résidants



Pic mineur J

Cliquez pour agrandissement

Photo : Serge Lachance

Prise de vue : Chemin du Huard

♂ : Dos blanc.

Bec plus court que la moitié de la tête.

Ailes noires tachetées de blanc.


Tache rouge derrière la tête.

Queue noire avec rectrices externes blanches tachetées de noir.

♀ : Dépourvue de tache rouge.

Junior : Front rougeâtre rayé.

Chant : Cri rapide descendant et *piik*.



Pic mineur J

Cliquez pour agrandissement

Photo : Serge Lachance

Prise de vue : Chemin du Huard

Habitat : Forêt de feuillus ou mixtes, bosquets, parcs urbains.

Particularités : Reste au Québec tout l'hiver

Espèces à ne pas confondre : Le Pic chevelu, le Pic mineur dont le bec est plus court, a des taches noires sur les plumes externes blanches de la queue. La tache rouge du ♂ n'est pas traversée par un trait noir.

Nidification : 4 à 5 œufs, nid dans une cavité qu'il creuse dans un arbre mort ou nichoir, couvaion de 12 jours par ♂ et ♀ nidicole. 1^{er} envol après 28 à 30 jours.

[Plus d'informations...](#)

Source : Guide d'identification Les oiseaux du Québec – Suzanne Brûlotte – Éditions Broquet www.broquet.qc.ca

Source : Le chant de cet animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts

Centre de conservation de la faune ailée - www.ccf-montreal.com