


Sittelle à poitrine rousse

28/33 cm - Zenaida macroura / Mourning Dove

Ordre : Columbiformes - Famille : Columbidae

Statut : Résidant



Sittelle à poitrine rousse ♂
Cliquez pour agrandissement
Photo : Denis Pelland
Prise de vue : Chemin du lac Carillon

♂ : Calotte noire.
Trait noir traversant l'œil.
Courte queue carrée.
Poitrine rousse.
Bec retroussé.

♀ : Dessus de la tête gris foncé, poitrine d'un roux plus pâle.

Junior : Ressemble à la ♀ mais plumage plus pâle et plus terne.

Chant : *Hank, hank*, fait penser à une trompette.




Habitat : Forêts de conifères ou mixtes.

Particularités Souvent aperçue sur des fils téléphoniques. En expansion depuis les années 80.

Espèces à ne pas confondre : Le chant du Grand-duc d'Amérique est entendu la nuit tandis que celui de la Tourterelle triste est beaucoup plus fréquent et entendu le jour.

Nidification : 2 œufs, nid dans la fourche ou sur la branche d'un arbre, couvain de 13 à 15 jours par ♂ et ♀, nidicole. 1^{er} envol après 10 à 15 jours.

[Plus d'informations...](#)




Sittelle à poitrine rousse ♂
Cliquez pour agrandissement
Photo : Denis Pelland
Prise de vue : Chemin du lac Carillon

Suite ↓



Sittelle à poitrine rousse ♂
Cliquez pour agrandissement
Photo : Claire Huot
Prise de vue : Chemin du Huard



Sittelle à poitrine rousse ♂
Cliquez pour agrandissement
Photo : Claire Huot
Prise de vue : Chemin du Huard

Source : Guide d'identification Les oiseaux du Québec – Suzanne Brûlotte – Éditions Broquet www.broquet.qc.ca
Source : Le chant de cet animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts
Centre de conservation de la faune ailée - www.cdfa-montreal.com