

Tourterelle triste

22/33 cm - Zenaida macroura / Mourning Dove

Ordre : Columbiformes - Famille : Columbidae

Statut : Résidant



Tourterelle triste ♂ ♀
Cliquez pour agrandissement
Photo : Serge Lachance
Prise de vue : Chemin du Huard

♂ ♀ : Petite tête.

Queue longue, pointue, bordée de blanc.

Quelques taches foncées sur l'aile et sur la joue.

Couleur beige.

Junior : Ressemble à l'adulte mais plumage en écailles.

Plus petite que l'adulte.

Poitrine légèrement tachetée.

Chant : *Rou-cou-cou*.



Tourterelle triste ♂ ♀
Cliquez pour agrandissement
Photo : Claire Huot
Prise de vue : Chemin du Huard

Habitat : Champs, ville et villages.

Vol : Départ rapide et bruyant qui fait sursauter.

Particularités : Souvent aperçue sur des fils téléphoniques. En expansion depuis les années 80.

Espèces à ne pas confondre : Le chant du Grand-duc d'Amérique est entendu la nuit tandis que celui de la Tourterelle triste est beaucoup plus fréquent et entendu le jour.

Nidification : 2 œufs, nid dans la fourche ou sur la branche d'un arbre, couvain de 13 à 15 jours par ♂ et ♀, nidicole. 1^{er} envol après 10 à 15 jours.

Source : Guide d'identification Les oiseaux du Québec – Suzanne Brûlotte – Éditions Broquet www.broquet.qc.ca

Source : Le chant de cet animal est tiré d'un des CD suivants - Les oiseaux de nos jardins - Les sons de nos forêts

Centre de conservation de la faune ailée - www.cdfa-montreal.com